

# Brechas de productividad en cultivos extensivos

**Convenio CREA-SYNGENTA  
2022-24**



# Contenidos

- **Objetivos del proyecto**
  - Descripción de los objetivos específicos del proyecto
- **Metodología**
  - Breve descripción de la metodología utilizada
- **Resumen de resultados**
  - Resultados parciales de las brechas estimadas por región, tipo de cultivo y ambiente
  - Principales causas que generan las brechas.

# Objetivos del proyecto

En el marco del proyecto “Brechas de Productividad” producto del acuerdo entre CREA y SYNGENTA (2022-24), se propusieron los siguientes objetivos principales:

- (1) Cuantificar la variabilidad de rendimientos de los cultivos de maíz, soja, trigo y girasol, obtenidos por los productores en distintas regiones del país, y las brechas de rendimientos.
- (2) Identificar los factores tecnológicos de mayor peso en la determinación de la brecha.
- (3) Cuantificar el aporte de diferentes tecnologías de insumos y procesos, sobre el incremento de la productividad de los cultivos extensivos, la eficiencia de uso de recursos y la reducción de la brecha de rendimientos.

# Metodología

Se analizó información histórica (5 campañas) de producción, manejo y ambiente, proveniente de la base DAT CREA (Datos Agrícolas Trazados de CREA).

- (1) Cuantificación de la brecha: Se estimó cómo la diferencia entre los rendimientos alcanzables (estimados a partir del rendimiento de los lotes que se ubicaron más cerca del rendimiento potencial de la región) y el rendimiento promedio para cada combinación de región, cultivo y tipo de ambiente (alta productividad, baja productividad, ambientes con influencia de napa).
- (2) Para identificar los factores tecnológicos de mayor peso en la determinación de la brecha, se comparó el manejo entre los lotes que lograron rendimientos cercanos al rendimiento alcanzable y los que lograron rendimientos cercanos al promedio.
- (3) Para cuantificar el aporte de diferentes tecnologías de insumos y procesos, sobre el incremento de la productividad de los cultivos extensivos, la eficiencia de uso de recursos y la reducción de la brecha de rendimientos, se analizaron tendencias de rendimiento ante cambios en las variables principales que definen la brecha.

# Resultados

Para cada combinación de región, cultivo y ambiente, se presenta el rendimiento alcanzable, y la brecha con el rendimiento logrado, en términos porcentuales y absolutos.



Se listan las variables que tienen mayor peso en la determinación de la brecha de rendimientos, ordenadas por relevancia.

Dentro de cada factor, entre paréntesis se indica el sentido de cambio, rango o umbral de manejo, que permitiría reducir la brecha de rendimientos.

Norte
Grupo de Madurez (Grupos Cortos)
Fósforo aplicado (>dosis)
Herbicidas en Barbecho (<2 Aplicaciones)
Fecha de siembra (anterior al 6 de Enero)

# Maíz Temprano y Tardío. Ambientes de Potencial Alto.

## Norte

Fecha de siembra  
(anterior al 1 de Enero)

Híbridos

Nitrógeno aplicado  
(>dosis)

Densidad de siembra  
(>6 sem/m<sup>2</sup>)



Rendimiento Alcanzable  
9576 kg/ha  
Brecha = 1430 kg/ha  
(15%)




**Norte:** en siembras con fecha anterior al 1 de enero, utilizando híbridos de alto potencial, con dosis superiores de nitrógeno aplicado y densidades de siembra mayores a 6 sem/m<sup>2</sup>, aumenta la probabilidad de posicionarse en niveles de rendimientos más cercanos al rendimiento alcanzable.

**Aclaración:** Estas interpretaciones están limitadas por efecto año (condiciones climáticas que se presenten)


# Norte – Ambientes con Potencial Alto



# Norte – Ambientes con Potencial Alto




—●— N aplicado  $\geq$  27 kg/ha    —●— N aplicado  $<$  27 kg/ha



■ N aplicado  $\geq$  27 kg/ha    ■ N aplicado  $<$  27 kg/ha



# Norte – Ambientes con Potencial Alto



Híbridos óptimos: P 2089, NEXT 25.8, AX 7822, DK 72-10, NEXT 22.6, DK 72-20.

# Maíz Temprano y Tardío. Ambientes de Potencial Bajo.

**Norte**

Antecesor  
(Soja)

Híbridos

Fecha de siembra  
(anterior al 25 de Diciembre)

Nitrógeno aplicado  
(>dosis)

Rendimiento Alcanzable  
8834 kg/ha  
Brecha = 1499 kg/ha  
(17%)





**Norte:** teniendo como antecesor soja, utilizando híbridos de alto potencial, en siembras con fecha anterior al 25 de diciembre y con dosis superiores de nitrógeno aplicado, aumenta la probabilidad de posicionarse en niveles de rendimientos más cercanos al rendimiento alcanzable.

**Aclaración:** Estas interpretaciones están limitadas por efecto año (condiciones climáticas que se presenten)





# Norte – Ambientes con Potencial Bajo




Híbridos óptimos: DK 72-10, P 2089, B 510, NEXT 22.6, DK 72-20, AX 7822, B 507, DK 73-20, NEXT 25.8, LT 722.


# Norte – Ambientes con Potencial Bajo



# Norte – Ambientes con Potencial Bajo



- FS anterior al 25 de Diciembre
- FS posterior al 25 de Diciembre



- FS anterior al 25 de Diciembre
- FS posterior al 25 de Diciembre



[www.crea.org.ar](http://www.crea.org.ar)



[/crea.org](https://www.facebook.com/crea.org)



[/canalcrea](https://www.youtube.com/canalcrea)



[@crea\\_arg](https://www.instagram.com/crea_arg)



[@crea\\_arg](https://twitter.com/crea_arg)